

FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO PÓS-CESARIANA: UMA REVISÃO NARRATIVA.

Ingrid da Silva Araujo¹

Thays Lopes Lucas²

Maria Letícia de Moura Leandro³

Sarah Lima Pinto⁴

O parto cesáreo é o tipo de parto mais prevalente no Brasil. Em conhecimento dessa realidade, torna-se necessário avaliar o risco de desenvolvimento de infecções relacionadas ao sítio cirúrgico, pois a exposição a determinados fatores de riscos pode elevar as taxas de morbimortalidade materna ou causar retardo na recuperação pós-cirúrgica, comprometendo a qualidade de vida da paciente e eficiência da assistência do serviço de saúde. Nesse sentido, identificar os fatores de risco que predispõem ao surgimento desta infecção, pode fornecer evidências para a prevenção e melhorar a qualidade da assistência em saúde. Objetivou-se identificar os fatores de risco para infecção do sítio cirúrgico após cesárea. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada em junho de 2023, norteada pela pergunta: Quais os fatores de risco para infecção do sítio cirúrgico após parto cesáreo? A busca de dados foi realizada na BVS, nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF. A pesquisa foi executada por meio de cruzamento com o operador booleano AND para associação dos descritores em ciências da saúde (DECs): "Fatores de risco", "Infecção do sítio cirúrgico", e "cesárea". Foram obtidos 60 artigos, no entanto, apenas 13 atenderam aos critérios de inclusão: texto completo, adequação à temática proposta e produção dos últimos cinco anos. Evidenciou-se que os fatores de risco mais prevalentes foram: comorbidades, processos infecciosos

¹Discente do 7º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA), Membro do Grupo de pesquisa e extensão em saúde cardiovascular e cerebrovascular (GPESCC), Membro do Grupo de pesquisa em Enfermagem e Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (GPESAH), Extensionista da Liga de Enfermagem em Neurociências, Extensionista da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem em Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (LACESAH). E-mail: ingrid.silva@urca.br

² Discente do 7º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA) Bolsista do Projeto Educação em Saúde para a Alta Hospitalar, Extensionista do programa APH na comunidade, Membro do Grupo de Pesquisa em Enfermagem e Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (GPESAH), Extensionista da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem em Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (LACESAH). E-mail: thays.lopes@urca.br

³ Discente do 7º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA) Membro e bolsista do Grupo de Pesquisa e Extensão em Saúde Cardiovascular e Cerebrovascular(GPESCC), Membro voluntário do Grupo de Pesquisa em Enfermagem e Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (GPESAH), Membro voluntário do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Práticas Avançadas em Saúde (GEPPAS), Membro voluntário da Liga acadêmica Cuidados de Enfermagem em Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (LACESAH), Extensionista do programa APH na comunidade, Extensionista do Projeto Educação em Saúde para a Alta Hospitalar . E-mail: marialeticia.moura@urca.br

⁴ Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA). Líder do Grupo de Pesquisa e Extensão em Enfermagem Perioperatória e de Centro de Material e Esterilização (GPEEP/CME), líder do Grupo de pesquisa em Enfermagem e Saúde do Adulto em Ambiente Hospitalar (GPESAH). E-mail: sarah.pinto@br

preexistentes, ruptura de membranas, parto prolongado, internação hospitalar no pós-operatório maior que sete dias, extremos de idade, morbidade psiquiátrica, tipo de cesariana, necessidade de transfusão sanguínea e perda sanguínea. Dessa forma, entende-se que a incisão cirúrgica do parto cesáreo quando associada à presença dos fatores de risco mencionados, pode favorecer a infecção do sítio cirúrgico, e a compreensão desses condicionantes permite a execução de ações de prevenção e promoção da saúde. Sendo assim, é importante destacar a necessidade de novos estudos sobre esse tema, tendo em vista a sua relevância.

Descritores: Fatores de risco; Infecção do sítio cirúrgico; Cesárea.